

Rojan Pharma

Rofaxim 550 mg

ROFAXIM 550 mg

قرص روکش دار روفاکسیم حاوی ۵۵۰ میلی گرم ریفاکسیمین می باشد.

روفاکسیم یک داروی آنتی بیوتیک است که باکتری ها را از بین می برد. این دارو برای درمان سندرم روده تحریک پذیر به همراه اسهال (IBS-D) در بزرگسالان استفاده می شود. روفاکسیم همچنین می تواند علائم انسفالوپاتی کبدی را که در بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته کبد رخ می دهد، بهبود بخشد یا از آن جلوگیری کند.

بسته بندی و شکل دارویی:

حاوی ۳۰ عدد قرص روکش دار آجری رنگ و بیضی شکل می باشد، در قوطی سفید پلی اتیلنی به همراه سیلیکاژل و برگه راهنما بیمار می باشد. موارد مصرف: روفاکسیم برای درمان سندرم روده تحریک پذیر به همراه اسهال (IBS-D) در بزرگسالان استفاده می شود.

میزان مصرف: دوز توصیه شده روفاکسیم برای سندرم روده تحریک پذیر به همراه اسهال، مصرف یک عدد قرص خوراکی ۵۵۰ میلی گرم، سه بار در روز به مدت ۱۴ روز است. در صورت بازگشت علائم، با همان دوز قبلی، درمان تکرار شود. دوز توصیه شده روفاکسیم برای انسفالوپاتی کبدی، مصرف یک عدد قرص خوراکی ۵۵۰ میلی گرم، دو بار در روز همراه با یک لیوان آب است.

عوارض جانبی: سرگیجه، سردرد، ضعف در تنفس، احساس بیماری، معده درد همراه با نفخ و تورم، اسهال، تحریک شدن پوست و خارش، گرفتگی عضلات، درد مفاصل، تورم پا، مچ پا یا انگشتان، کم خونی، از دست دادن اشتها، هیپرکالمی، گیجی، اضطراب، احساس خواب آلودگی، تب، ادم.

در صورت داشتن هرگونه عوارض جانبی زیر، حتماً مصرف روفاکسیم را قطع کنید و بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید:
غیرمتداول:

- خونریزی از رگ های خونی متورم در گلو (واریس مری)
- اسهال شدید در هنگام و پس از طول درمان با روفاکسیم شناخته نشده:
- واکنش آلرژیک، حساسیت بیش از حد یا آنژیوادم. علائم عبارتند از: تورم صورت، زبان یا گلو، مشکلات بلعی، کهیر و مشکلات تنفسی.
- هرگونه خونریزی غیرمنتظره، غیرمعمول یا کبودی که ممکن است به علت کاهش پلاکت های خون باشد.

چگونگی نگهداری روفاکسیم:

- روفاکسیم را در دمای زیر ۳۰ درجه سانتی گراد در ظرف اصلی خود نگهداری نمایید تا در برابر نور و رطوبت محافظت شود.
- این دارو را بعد از تاریخ انقضای درج شده بر روی بطری و جعبه، مصرف نکنید. تاریخ انقضای درج شده، آخرین روز در همان ماه می باشد.
- پس از هر بار مصرف درپوش بطری را محکم ببندید.
- دارو را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.



Rojan Pharma

Rofaxim 550 mg

هشدارها و اقدامات احتیاطی

- از مصرف روفاکسیم پرهیز کنید اگر:
 - به هر یک از این مواد حساسیت دارید: ریفاکسیمین، انواع آنتی‌بیوتیک‌های مشابه (مانند ریفامپیسین یا ریفابوتین)، هر یک از مواد تشکیل‌دهنده این دارو (در بخش ۶ ذکر شده است).
 - انسداد روده دارید
 - مبتلا به اسهال همراه با تب و یا خون در مدفوع و یا اسهالی که به دلیل آلودگی به غیر از باکتری اشرشیاکلائی ایجاد شده است، باشید.
- هنگام مصرف روفاکسیم، رنگ ادرار شما ممکن است به رنگ قرمز درآید که این کاملاً طبیعی است. درمان طولانی مدت با هر آنتی‌بیوتیک شامل ریفاکسیمین ممکن است باعث اسهال شدید شود. این می‌تواند چند ماه پس از پایان مصرف دارو اتفاق بیفتد.
- اگر در طول یا بعد از استفاده از روفاکسیم به اسهال شدید مبتلا شدید، باید مصرف روفاکسیم را قطع کنید و بلافاصله به پزشک خود اطلاع دهید.
- روفاکسیم برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌شود. استفاده از این دارو در این گروه سنی مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی

اطلاعات کافی در مورد مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی وجود ندارد لذا مصرف روفاکسیم در این دوران بدون تجویز پزشک توصیه نمی‌شود.

